

## NorLevo® tablet 1,5 mg

### Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning skal du altid følge vejledningen i denne information.
- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

### Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger NorLevo®
3. Sådan skal du bruge NorLevo®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

### NorLevo® tabletter 1,5 mg indeholder:

Det virksomme indholdsstof i NorLevo® er levonorgestrel.

De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, povidon (E 1201) og vandfri kolloid silica (E 551).

### Markedsføring i Danmark

Laboratoire HRA Pharma  
15, rue Bérangeur, F-75003 Paris

### Fremstiller

Cardinal Health France 429 S.A.S.  
17, rue du Pontoise, F-95520 Osny

### Repræsentant i Danmark

Nycomed Danmark ApS  
Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde

### 1. Virkning og anvendelse

NorLevo® er en hvid, rund og buet tablet mærket "NL 1.5" på den ene side.

NorLevo® er et nødpræventionsmiddel til anvendelse hurtigst muligt, helst inden 12 timer og senest 72 timer, efter ubeskyttet samleje eller svigt af anden prævention.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

### 2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger NorLevo®

Brug ikke NorLevo® ved overfølsomhed over for levonorgestrel eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

### Særlige forholdsregler

Nødprævention bør kun anvendes lejlighedsvis. Den må aldrig erstatte almindelige præventionsmidler. Nødprævention forhindrer ikke altid graviditet, specielt ikke hvis der er usikkerhed omkring tidspunktet for det ubeskyttede samleje.

Efter brug af NorLevo® får du sædvanligvis en menstruation af normal styrke og til normal tid, eventuelt nogle få dage tidligere eller senere.

Det anbefales, at du kontakter din læge for at finde en præventionsmetode, der passer dig fremover.

Hvis du har brugt NorLevo® efter at have taget din p-pille for sent, skal du fortsætte med p-pillerne perioden ud.

Det vides ikke:

- om nødprævention kan forhindre en graviditet uden for livmoderen
- om en graviditet uden for livmoderen vil fortsætte med at udvikle sig, selv om du har haft en blødning

Du skal være opmærksom på, at:

- hvis du bliver gravid efter brug af NorLevo®, er der en lille risiko for, at graviditeten er uden for livmoderen
- hvis du kaster op inden 3 timer efter indtagelse af tableten, kan virkningen være udeblevet, og du bør straks tage en ny tablet
- hvis du lider af Crohn's sygdom, kan det nedsætte effekten af NorLevo®
- brug af NorLevo® beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme (som for eksempel klamydia, kønsvorter, HIV)

Du skal testes for graviditet ved en graviditetstest, hvis:

- din næste menstruation er forsinket mere end 5 dage
- du får en unormal blødning omkring det forventede menstruationstidspunkt
- du har symptomer på graviditet
- du bruger p-piller, og menstruationen udebliver i næste p-pillefri periode

### Brug af NorLevo® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage NorLevo® sammen med mad og drikke.

### Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i NorLevo®

NorLevo indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin i forbindelse med graviditet eller i ammeperioden.

### Graviditet

NorLevo® virker ikke, hvis du allerede er gravid. Hvis NorLevo® bruges, og det senere viser sig, at du er gravid, er der ikke fare for misdannelser på fosteret, hvis normal dosering er fulgt. NorLevo® kan ikke afbryde graviditet senere end 3 døgn (72 timer) efter samleje.

### Amning

NorLevo® kan anvendes under amning. Da NorLevo® udskilles i modermælken, anbefales det at amme umiddelbart før tableten tages samt at undgå amning i mindst 6 timer efter indtagelse.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

NorLevo® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### Brug af anden medicin

Effekten af NorLevo® kan formindskes eller udeblive helt, hvis du samtidig er i behandling med:

- lægemidler mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, primidon og carbamazepin)
- antibiotika (rifabutin, rifampicin og griseofulvin)
- lægemiddel mod HIV (ritonavir)
- naturlægemidler, der indeholder perikon

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

### 3. Sådan skal du bruge NorLevo®

Voksne: 1 tablet hurtigst muligt, helst inden 12 timer og senest 72 timer (3 dage) efter ubeskyttet samleje. NorLevo® kan bruges når som helst i en cyklus.

Børn: Må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis du kaster op inden 3 timer efter indtagelse af tableten, bør du tage 1 ny tablet med det samme.

Efter brug af NorLevo® anbefales det at bruge lokal svangerskabsforebyggelse (kondom, pessar eller sæddræbende creme) indtil starten af næste menstruation.

Tabletten tages sammen med væske.

### Har du taget for mange NorLevo®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere NorLevo® end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme og efterfølgende blødning.

### 4. Bivirkninger

NorLevo® kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Cirka hver 3. person, der bruger NorLevo®, vil opleve bivirkninger såsom brystspænding, pletblødning og uregelmæssig blødning. Disse bivirkninger kan være indtil næste menstruation. Der er endvidere set overfølsomhedsreaktioner på huden (hyppigheden af denne bivirkning er endnu ukendt).

### Alvorlige bivirkninger

Der er ingen alvorlige bivirkninger.

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Meget almindelige bivirkninger** (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, hovedpine, forsinkelse af menstruation (mere end 7 dage), smerte i underlivet, blødning, kraftig menstruation, træthed, brystspænding og svimmelhed.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  
Opkastning og diare.

Disse bivirkninger forsvinder normalt inden for 48 timer efter indtagelse af tableten.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

### 5. Opbevaring

Opbevar NorLevo® utilgængeligt for børn. Opbevar NorLevo® i original karton beskyttet mod lys.

Anvend ikke NorLevo® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

### 6. Yderligere information

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er Du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail [info@nycomed.com](mailto:info@nycomed.com)