

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent consultez un médecin.

Ce médicament vous est destiné personnellement et ne pourra être donné à une autre personne.

**Contenu de cette notice :**

1. Qu'est ce que Norlevo 1,5 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norlevo 1,5 mg comprimés ?
3. Comment prendre Norlevo 1,5 mg comprimés ?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Norlevo 1,5 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.



**• La substance active est :**

Lévonorgestrel ..... 1,5 mg pour un comprimé

**• Les autres composants sont :**

Lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

**TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ, FABRICANT ET IMPORTATEUR**

**Titulaire de l'enregistrement**

Laboratoire HRA-Pharma  
15 rue Béranger  
75003 Paris - France

**Importateur**

Besins Manufacturing Belgium  
Groot-Bijgaardenstraat, 128  
1620 Drogenbos - Belgique

**Fabricants**

DELPHARM Lille et Cardinal Health France 429 S.A.S.  
Z.I. Roubaix Est - Rue de Toufflers 17, rue de Pontoise  
59390 Lys-les-Lannoy - FRANCE 95520 Osny - FRANCE

**NUMERO DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

2536 IE 2 F3

**1. QU'EST-CE QUE NORLEVO 1,5 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé blanc, rond, biconvexe, en boîte de 1, 5, 10, 25 ou 50 comprimés. Les présentations de 5, 10, 25 ou 50 comprimés sont à usage hospitalier uniquement.

**LE GROUPE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE :**

Le Lévonorgestrel appartient au groupe des progestatifs.

**LES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

Norlevo est indiqué dans la contraception d'urgence

**Qu'est-ce que la contraception d'urgence ?**

La contraception d'urgence est une méthode de rattrapage qui vise à éviter l'ovulation ou l'implantation d'un œuf fécondé en cas de rapport sexuel non protégé.

**Quand utiliser cette contraception d'urgence ?**

Cette contraception d'urgence doit être utilisée le plus tôt possible pour permettre une meilleure efficacité, préféablement dans les 12 heures après le rapport sexuel non protégé et au plus tard dans les 72 heures (3 jours), après le rapport sexuel non protégé, notamment dans les cas suivants :

- si vous avez eu un rapport sexuel sans méthode de contraception ;
- si vous avez oublié de prendre votre pilule contraceptive ;
- si le préservatif de votre partenaire s'est rompu ;
- si vous avez l'impression que votre stérilet a été expulsé ;
- si votre cape contraceptive ou votre diaphragme se sont déplacés ou si vous les avez enlevés trop tôt ;
- si vous craignez un échec de la méthode du rapport sexuel interrompu ou de la méthode des températures ;
- en cas de viol.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NORLEVO 1,5 mg, comprimés ?**

**Ne prenez pas Norlevo 1,5 mg :**

- si vous êtes hypersensible (allergique) au lévonorgestrel ou à l'un des composants du comprimé de Norlevo 1,5 mg

**Faites attention :**

La contraception d'urgence ne doit être utilisée que de façon exceptionnelle. En effet :

- elle ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas.
- le surdosage hormonal qu'elle entraîne n'est pas souhaitable en cas de prise régulière ;
- elle ne peut remplacer une contraception régulière.

**Ce n'est pas une méthode d'interruption de grossesse.**

Si vous avez eu dans le même cycle un premier rapport sexuel non protégé qui date de plus de 72 heures, une fécondation liée à ce premier rapport non protégé est possible. Le traitement par Norlevo pris après un deuxième rapport sexuel non protégé peut alors être inefficace pour prévenir une grossesse. Norlevo 1,5 mg n'est pas recommandé :

- si vous avez déjà eu une grossesse extra-utérine (grossesse qui se développe en dehors de l'utérus, le plus souvent dans une trompe utérine) ou si vous avez eu une salpingite (infection des trompes utérines) car le risque de développer une grossesse extra-utérine est plus élevé.
- si vous souffrez de troubles graves du fonctionnement du foie ou de troubles graves d'absorption intestinale des aliments, comme par exemple la maladie de Crohn, car l'efficacité de Norlevo peut être diminuée.
- si vous êtes intolérant au lactose

En cas de vomissements survenant dans les trois heures suivant la prise du comprimé, un autre comprimé doit être pris immédiatement.

Il n'est pas recommandé d'utiliser plusieurs fois Norlevo 1,5 mg, au cours d'un même cycle menstruel en raison de la possibilité de perturbations importantes du cycle. Une méthode de contraception à long terme doit être envisagée.

Après la prise de Norlevo 1,5 mg, les règles sont généralement normales et surviennent à la date prévue.

Cependant, il est nécessaire de faire un test de grossesse afin de s'assurer que vous n'êtes pas enceinte :

- si les règles surviennent avec un retard de plus de cinq jours,
- si les saignements vous semblent anormaux même s'ils surviennent à la date prévue des règles.

1

L'utilisation de la contraception d'urgence ne dispense pas des précautions à prendre contre les maladies sexuellement transmissibles et des mesures à suivre en cas de risque de transmission.

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Utilisation de Norlevo 1,5 mg en association avec d'autres médicaments". Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessous est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

**UTILISATION DE NORLEVO EN ASSOCIATION AVEC DES ALIMENTS OU DES BOISSONS.**

Sans objet.

**GROSSESSE**

Ce médicament n'est pas indiqué en cas de grossesse en cours.

En cas d'échec de cette contraception d'urgence, si la grossesse se poursuit, il n'y a pas de risque particulier de malformation du fœtus.

Dans le cas d'une prise de lévonorgestrel supérieure à 1,5 mg, on ne connaît pas les conséquences pour l'enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**ALLAITEMENT**

L'allaitement est possible. Cependant, le lévonorgestrel étant sécrété dans le lait maternel, il est recommandé d'allaiter immédiatement avant de prendre le comprimé de Norlevo 1,5 mg, et d'éviter d'allaiter au moins pendant 6 heures après la prise de Norlevo 1,5 mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES**

Il n'existe pas de données sur les effets de ce médicament sur les capacités individuelles à conduire un véhicule ou à utiliser une machine.

**INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CERTAINS COMPOSANTS DE NORLEVO**

Chaque comprimé de Norlevo 1,5 mg contient du lactose. Si vous êtes intolérant à certains sucres, veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

**UTILISATION DE NORLEVO EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS**

La prise simultanée de médicaments tels que certains anticonvulsivants (phénobarbital, phénytoïne, primidone, carbamazépine), certains antibiotiques tels que rifabutine, rifampicine, griséofulvine, ritonavir (antiviral) et l'*Hypericum perforatum* (Millepertuis, plante utilisée dans les dépressions légères) peut diminuer ou annuler l'efficacité de cette contraception d'urgence.

Veuillez informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

**3. COMMENT PRENDRE NORLEVO 1,5 mg, comprimés ?**

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ne vous en ait donné d'autres.

En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Le traitement est d'un comprimé. Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau.

Le comprimé doit être pris le plus tôt possible, préféablement dans les 12 heures après le rapport sexuel non protégé, et au plus tard dans les 72 heures (3 jours) après le rapport.

La contraception d'urgence est d'autant plus efficace qu'elle est utilisée rapidement. En effet, son efficacité diminue environ de moitié entre 24 et 72 heures.

Ce médicament peut être pris à n'importe quel moment du cycle menstruel. L'utilisation de Norlevo 1,5 mg n'empêche pas de prendre votre pilule contraceptive habituelle.

Si vous avez utilisé Norlevo 1,5 mg en raison d'un oubli de pilule contraceptive, vous devez continuer à prendre la plaquette en cours jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas vos règles à la fin de la plaquette, vous devrez vous assurer que vous n'êtes pas enceinte en effectuant un test de grossesse.

Après utilisation de cette contraception d'urgence et jusqu'à vos prochaines règles il est vivement recommandé d'utiliser lors des rapports sexuels suivants un moyen de contraception local (préservatif, cape cervicale, spermicide).

**SI VOUS AVEZ PRIS PLUS DE NORLEVO QUE VOUS N'AURIEZ DÛ**

Il n'a pas été démontré de toxicité aiguë de ce médicament en cas de prise de plusieurs doses.

Des nausées ainsi que des saignements pouvant faire penser à des règles peuvent se produire.

Il n'y a pas d'antidote spécifique, le traitement doit être symptomatique.

Si vous avez utilisé ou pris trop de NORLEVO, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070/245.245)

**SI VOUS AVEZ OUBLIÉ DE PRENDRE NORLEVO**

L'efficacité de ce médicament n'est pas assurée dans le cas où le comprimé n'a pas été pris dans les conditions recommandées. Dans ce cas, assurez-vous que vous n'êtes pas enceinte, si vous n'avez pas vos règles à la date prévue.

**EFFET POUVANT APPARAÎTRE LORSQUE LE TRAITEMENT PAR NORLEVO EST ARRÊTÉ**

Sans objet.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, NORLEVO 1,5 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Les effets indésirables qui ont été observés sont :

- des nausées et des vomissements,
- des vertiges, une fatigue, des maux de tête,
- des douleurs dans le bas du ventre,
- des réactions d'hypersensibilité (allergies) cutanées,
- une sensation de tension des seins,
- un retard de règles,
- des règles abondantes,
- de la diarrhée

Des saignements pouvant faire penser à des règles, peuvent survenir après la prise de Norlevo 1,5 mg. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER NORLEVO 1,5 mg, comprimés ?**

N'utilisez plus NORLEVO après la date de péremption.

La date de péremption est indiquée en regard du sigle Ex. Les 4 chiffres placés après ce sigle désignent le mois (dernier jour) et l'année à partir desquels le produit sera périmé.

Conserver le blister dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Rapporter à votre pharmacien pour élimination tout comprimé présentant des signes de détérioration.

## 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.  
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :  
Besins Manufacturing Belgium  
Groot-Bijgaardenstraat, 128  
B-1620 DROGENBOS - BELGIQUE  
Tel: + 32 (0) 26 29 43 38  
E-mail: ppiet@besins-healthcare.com  
Délivrance libre.

La dernière mise à jour de cette notice date du 21 avril 2008.  
La date d'approbation de la notice est juillet 2008.

### CONSEILS / ÉDUCATION SANITAIRE

#### a) Quelques notions sur :

##### - *le cycle menstruel*

Le cycle menstruel est le temps écoulé entre deux épisodes de règles. Le plus souvent, le cycle dure 28 jours, il débute le premier jour des règles et se termine le premier jour des règles suivantes. Mais la durée d'un cycle peut varier d'une femme à l'autre.

Les règles surviennent quand une femme n'est pas enceinte.

##### - *la fécondation*

Au milieu du cycle, un ovule est expulsé par un des 2 ovaires (ce moment est appelé "ovulation"). En général, l'ovulation se produit au milieu du cycle mais elle peut se produire à n'importe quel moment du cycle.

Si des spermatozoïdes se trouvent au voisinage de l'ovule, la "fécondation" (c'est à dire la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde pour créer un embryon) peut avoir lieu.

Au bout de quelques jours, l'œuf fécondé va se fixer (ou "s'implanter") dans l'utérus, et la grossesse commence.

#### - *la contraception*

Les méthodes de contraception visent à empêcher :

- soit l'ovulation : c'est le cas de la pilule contraceptive,
- soit la fécondation (rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule) : c'est le cas des préservatifs,
- soit l'implantation si l'ovule est fécondé : c'est le cas du stérilet.

#### - *la contraception d'urgence*

La contraception d'urgence vise à bloquer l'ovulation ou empêcher la fécondation au cours d'un cycle. En revanche, elle est inefficace dès lors que l'implantation a commencé.

En l'absence de contraception, une femme ne peut jamais écarter la possibilité de devenir enceinte après un rapport sexuel.

Si vous avez utilisé ce médicament et que vous n'avez pas habituellement de contraception, il est vivement recommandé de consulter votre médecin pour discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à votre cas.

#### b) Rappels des risques à la suite d'un rapport sexuel sans préservatif et conseils

Si vous craignez une grossesse, cela peut signifier que vous n'avez pas utilisé de préservatif (ou que vous l'avez mal utilisé) lors du rapport sexuel. Vous pouvez donc avoir contracté une maladie sexuellement transmissible ou le virus du sida, si vous ne connaissez pas bien l'état de santé de votre partenaire ou si vous avez plusieurs partenaires. Il faut consulter au plus vite votre médecin afin qu'il puisse vous proposer un dépistage et éventuellement un traitement précoce.

Lors de vos prochaines relations sexuelles, il convient de prendre les mesures les plus appropriées à votre situation pour prévenir une grossesse non désirée ou une maladie sexuellement transmissible et pour empêcher une contamination par le virus du sida. Consultez votre médecin ou un centre de planning familial.

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Hij bevat informatie die belangrijk is voor uw behandeling.**

Heeft u nog andere vragen of twijfelt u, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.  
 - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 - Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen veranderen of niet verbeteren.  
 Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.

#### In deze bijsluiter:

1. Wat is Norlevo 1,5 mg, tablet en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Norlevo 1,5 mg, tablet inneemt
3. Hoe wordt Norlevo 1,5 mg, tablet ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Norlevo 1,5 mg, tablet
6. Aanvullende informatie

**NORLEVO**  
1,5 mg TABLET

#### • De werkzame stof is:

Levonorgestrel ..... 1,5 mg  
voor een tablet

#### • De andere bestanddelen zijn:

Lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon, anhydriech colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

#### HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, FABRICANT EN INVOERDER

##### Registratiehouder

Laboratoire HRA-Pharma  
15 rue Béranger  
75003 Parijs - Frankrijk

##### Fabrikant

DELPHARM Lille

Z.I. Roubaix Est - Rue de Toufflers  
59390 Lys-les-Lannoy - FRANKRIJK

##### Invoerder

Besins Manufacturing Belgium  
Groot-Bijgaardenstraat, 128  
B-1620 Drogenbos - België

Cardinal Health France 429 S.A.S.

17, rue de Pontoise  
95520 OSNY -FRANKRIJK

#### NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

2536 IE 2 F3

#### 1. WAT IS NORLEVO 1,5 MG, TABLET EN WAARVOOR WORDT HET GEbruIKT

Dit geneesmiddel wordt aangeboden in de vorm van een witte, ronde, biconvexe tablet in een doos met 1, 5, 10, 25 of 50 tabletten. De dozen met 5, 10, 25 of 50 tabletten zijn uitsluitend bestemd voor ziekenhuisgebruik.

##### FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP:

Levonorgestrel behoert tot de groep van de progestativa.

##### TERAPEUTISCHE INDICATIES

Norlevo is aangewezen als noodcontraceptie

##### Wat is noodcontraceptie?

Noodcontraceptie is een methode om de eisprong of innesteling van een bevrucht eitje te voorkomen bij niet-beschermde geslachtsbetrekkingen.

##### Wanneer deze noodcontraceptie gebruiken?

Om doeltreffend te zijn, dient de noodcontraceptie zo snel mogelijk te worden gebruikt, bij voorkeur binnen 12 uur na de onbeschermde geslachtsbetrekkingen en uiterlijk binnen 72 uur (3 dagen) na de onbeschermde geslachtsbetrekkingen, met name in de volgende gevallen:

- als u geslachtsbetrekkingen hebt gehad zonder gebruik van een voorbehoedmiddel;
- als u vergeten bent uw pil in te nemen;
- als het condoom van uw partner gescheurd is;
- als u de indruk hebt dat uw spiraaltje werd uitgestoten;
- als uw pessarium of diafragma verplaatst is of als u het te vroeg hebt weggenomen;
- als u vrees dat de methode van coitus interruptus of de temperatuurmethode mislukt is;
- bij verkrachting.

#### 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NORLEVO 1,5 MG, TABLET INNEEMT?

Neem Norlevo 1,5 mg niet in:

- als u overgevoelig (allergisch) bent voor levonorgestrel of een van de andere bestanddelen van Norlevo 1,5 mg.
- als u zeldzame erfelijke stoornissen vertoont van galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie.

#### Opgelet:

Noodcontraceptie mag maar uitzonderlijk worden gebruikt.

##### Want:

- een zwangerschap kan niet altijd voorkomen worden.
- de hormonale overdosering die ze teweegbrengt bij regelmatig gebruik, is niet wenselijk;
- ze kan een regelmatige contraceptie niet vervangen.

##### Het is geen methode voor zwangerschapsonderbreking.

Indien u in dezelfde cyclus een eerste maal onbeschermde geslachtsbetrekkingen heeft gehad die meer dan 72 uur geleden zijn, is het mogelijk dat een bevruchting gebeurt als gevolg van dat eerste onbeschermde contact. De behandeling met Norlevo na een tweede onbeschermde contact kan dan ondoeltreffend zijn om een zwangerschap te voorkomen.

Norlevo 1,5 mg, tablet wordt niet aanbevolen:

- als u al een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt gehad (zwangerschap die zich buiten de baarmoeder ontwikkelt, meestal in de eileider) of als u een salpingitis (infectie van de eileiders) hebt doorgemaakt, want het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is dan verhoogd.
- als u een ernstige leverziekte of een ernstig probleem van malabsorptie hebt, bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, want de doeltreffendheid van Norlevo kan dan verminderd zijn.
- als u overgevoelig (allergisch) bent aan lactose.

Als u binnen drie uur na innname van de tablet moet braken, moet u meteen een andere tablet innemen.

Het wordt niet aanbevolen Norlevo 1,5 mg, tablet meerdere malen tijdens dezelfde menstruele cyclus te gebruiken aangezien dat de cyclus sterk zou kunnen verstoren. Het verdient aanbeveling een anticonceptiemethode te kiezen die geschikt is om op lange termijn te gebruiken.

Na innname van Norlevo 1,5 mg wordt u meestal normaal ongesteld op de voorziene datum.

U dient wel een zwangerschapstest uit te voeren om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent:

- als het meer dan vijf dagen duurt voordat u uw regels krijgt,
- als het bloedverlies abnormaal lijkt, ook al is het op de voorziene datum van de regels.

Het gebruik van noodcontraceptie wil niet zeggen dat u geen voorzorgsmaatregelen moet nemen tegen seksueel overdraagbare ziekten en dat u geen maatregelen moet treffen als er een risico van overdracht bestaat. Als u al andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Gebruik van Norlevo 1,5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen".

Neem contact op met uw arts als een van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

#### INNAME VAN NORLEVO 1,5 MG, TABLET MET VOEDSEL EN DRANK

Niet van toepassing.

#### ZWANGERSCHAP

Dit geneesmiddel is niet aangewezen als u zwanger bent.

Als deze noodcontraceptie zou mislukken en u toch zwanger zou worden, is er geen bepaald risico voor misvormingen van de foetus.

Bij innname van meer dan 1,5 mg levonorgestrel zijn de gevolgen voor het kind niet bekend.

Vraag daar aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt.

#### BORSTVOEDING

Borstvoeding is mogelijk. Levonorgestrel wordt echter uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt aanbevolen borstvoeding te geven juist voor innname van de tablet van Norlevo 1,5 mg en geen borstvoeding te geven gedurende minstens 6 uur na innname van Norlevo 1,5 mg.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

#### RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

Er bestaan geen gegevens over de effecten van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te gebruiken.

#### BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ENKELE BESTANDDELEN VAN NORLEVO

Elke tablet van Norlevo 1,5 mg bevat lactose. Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

#### GEBRUIK VAN NORLEVO 1,5 MG, TABLET IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Gelijktijdige innname van geneesmiddelen zoals: bepaalde anti-epileptica (fenobarbital, fenytoïne, primidon, carbamazepine), bepaalde antibiotica zoals rifabutine, rifampicine, griseofulvine, ritonavir; *Hypericum perforatum* (sint-janskruid, een plant die gebruikt wordt bij lichte depressies) kan de doeltreffendheid van deze noodcontraceptie verminderen tenietdoen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

### 3. HOE WORDT NORLEVO 1,5 MG, TABLET GEBRUIKT

Volg deze instructies nauwkeurig, behalve wanneer uw arts andere instructies heeft gegeven.  
Raadpleeg uw arts of apotheker in geval van twijfel.  
De behandeling bestaat uit **een tablet**. De tablet moet worden doorgeslikt met een glas water.  
De tablet moet zo snel mogelijk worden ingenomen, indien mogelijk binnen 12 uur na de onbeschermde geslachtsbetrekkingen en uiterlijk binnen 72 uur (3 dagen) na de betrekkingen.

Hoe sneller de noodcontraceptie wordt gebruikt, des te efficiënter is ze. De doeltreffendheid vermindert namelijk met ongeveer de helft tussen 24 en 72 uur.

Dit geneesmiddel kan op om het even welke dag van de cyclus worden ingenomen.  
Het gebruik van NorLevo belet niet het gebruik van uw gebruikelijke anticonceptie.  
Als u Norlevo 1,5 mg gebruikt omdat u uw pil bent vergeten in te nemen, moet u de strip blijven innemen tot op het einde. Als u uw regels niet krijgt op het einde van de strip, moet u nagaan of u niet zwanger bent door een zwangerschapstest uit te voeren.  
Na gebruik van deze noodcontraceptie en tot u uw volgende regels krijgt, wordt het stellig aanbevolen een **plaatselijk voorbehoedmiddel** (condoom, diafragma, spermicide) te gebruiken bij de volgende geslachtsbetrekkingen.

#### WAT U MOET DOEN ALS U MEER NORLEVO HEEFT INGENOMEN DAN U ZOU MOGEN

Er werd geen acute toxiciteit vastgesteld bij innname van meerdere doses van dit geneesmiddel.  
Het is mogelijk dat uw misselijkheid wordt of een bloeding krijgt die op een menstruatie lijkt.  
Er staat geen specifiek antidotum; een symptomatische behandeling is dus aangewezen.  
Wanneer u te veel van NORLEVO hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

#### WAT U MOET DOEN WANNEER U BENT VERGETEN NORLEVO IN TE NEMEN

De doeltreffendheid van het geneesmiddel is niet verzekerd als u de tablet niet hebt gebruikt zoals aanbevolen. In dat geval moet u nagaan of u niet zwanger bent als u uw regels niet op de voorzienre datum krijgt.

#### ALS U STOPT MET GEBRUIK VAN NORLEVO

Niet van toepassing.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan NORLEVO 1,5 mg, tablet bijwerkingen veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- misselijkheid en braken
- duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn,
- pijn in de onderbuik,
- overgevoelighedsreacties ter hoogte van de huid (allergie),
- een gevoel van gespannen borsten,
- een uitstel van de regels,
- overvloedige regels,
- diarree.

Bloedingen die kunnen doen denken aan de regels, kunnen optreden na innname van Norlevo 1,5 mg.  
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### 5. HOE BEWAART U NORLEVO 1,5 mg, tablet

NORLEVO niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld na de aftrekking EX. De 4 cijfers geven de maand (laatste dag) en het jaar weer waarna het product niet meer mag worden gebruikt.

Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking, beschut tegen licht.

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Tabletten die zichtbare tekenen van bederf vertonen, naar uw apotheker terugbrengen.

#### 6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Desgewenst kan u ook contact opnemen met de lokale contactpersoon van de registratiehouder:

Besins Manufacturing Belgium

Groot-Bijgaardenstraat, 128

B-1620 DROGENBOS - BELGIË

Tel: + 32 (0) 26 29 43 38

E-mail: ppiette@besins-healthcare.com

Vrije afgifte.

Laatste bijwerking van de bijsluiter 21 april 2008.

De bijsluiter werd goedgekeurd juli 2008.

#### RAADGEVINGEN / GEZONDHEIDSOPVOEDING

##### a) Enkele begrippen:

###### - de menstruele cyclus

De **menstruele cyclus** is de tijd die verloopt tussen twee maandstonden. Meestal duurt een cyclus 28 dagen. De cyclus begint op de eerste dag van de regels en eindigt op de eerste dag van de volgende regels. Maar de duur van de cyclus kan variëren van de ene vrouw tot de andere.

Een vrouw krijgt haar regels alleen als ze niet zwanger is.

###### - bevruchting

In het midden van de cyclus wordt een eicel uitgestoten door een van de 2 eierstokken (dat wordt "eisprung" genoemd). Over het algemeen vindt de eisprung plaats in het midden van de cyclus, maar

de eisprung kan om het even wanneer in de cyclus plaatsvinden.

Als er zich spermatozoa in de buurt van de eicel bevinden, kan "bevruchting" (ontmoeting tussen de eicel en een spermatozoïn met vorming van een embryo) plaatsvinden.

Na enkele dagen gaat het bevruchte eitje zich in de baarmoeder nestelen en begint de zwangerschap.

###### - contraceptie

Contraceptieve methoden dienen om

- de eisprung te verhinderen: dat is wat de "pil" doet,
- de bevruchting (ontmoeting tussen spermatozoa en de eicel) te verhinderen: dat is wat een condoom doet,
- de innesteling van het bevruchte eitje te verhinderen: dat is wat een spiraaltje doet.

###### - noodcontraceptie

Noodcontraceptie beoogt de eisprung te blokkeren of bevruchting te verhinderen tijdens een cyclus. Ze werkt echter niet als de innesteling al begonnen is.

Een vrouw die geen voorbehoedmiddel gebruikt, mag nooit uitsluiten dat ze zwanger zou kunnen worden na geslachtsbetrekkingen.

Als u dit geneesmiddel hebt gebruikt en als u gewoonlijk geen voorbehoedmiddel gebruikt, wordt het stellig aanbevolen uw arts te raadplegen om te praten over een regelmatige contraceptieve methode die voor u geschikt is.

###### b) Risico's van geslachtsbetrekkingen zonder condoom en raadgevingen

Als u vreest dat u zwanger bent, kan dat betekenen dat u geen condoom hebt gebruikt (of dat u het slecht hebt gebruikt) bij geslachtsbetrekkingen. U kunt dan ook een seksueel overdraagbare ziekte of het aidsvirus hebben opgelopen als u de gezondheidstoestand van uw partner niet goed kent of als u meerdere partners hebt. U moet zo snel mogelijk uw arts raadplegen opdat hij u een screening en eventueel een behandeling in een vroeg stadium zou kunnen voorstellen.

Bij volgende geslachtsbetrekkingen moet u de geschikte maatregelen nemen om een ongewenste zwangerschap, een seksueel overdraagbare ziekte of een besmetting met het aidsvirus te voorkomen. Raadpleeg uw arts of een centrum voor gezinsplanning.

#### NUMMER DER VERMARKTZULASSUNG

2536 IE 2 F3

#### 1. WAS IST NORLEVO 1,5 mg Tabletten UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dieses Arzneimittel wird in Form einer weißen, runden, bikonvexen Tablette in Packungen zu 1, 5, 10, 25 oder 50 Tabletten angeboten. Die Darreichungsformen mit 5, 10, 25 oder 50 Tabletten sind der Anwendung im Krankenhaus vorbehalten.

#### PHARMAKOTHERAPEUTISCHE GRUPPE:

Levonorgestrel gehört zur Gruppe der Gestagene.

#### BEHANDLUNGSANZEIGEN:

Norlevo ist für die Notfallverhütung angezeigt.

#### Was ist Notfallverhütung?

Notfallverhütung ist eine Akutmethode zur Verhinderung des Eisprungs oder der Einnistung einer befruchteten Eizelle nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr.

#### Wann ist diese Notfallverhütung anzuwenden?

Diese Notfallverhütung muss so früh wie möglich angewendet werden, um eine optimale Wirkung sicherzustellen, vorzugsweise innerhalb von 12 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr und spätestens 72 Stunden (3 Tage) nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, insbesondere nach den folgenden Fällen:

- Wenn Sie Geschlechtsverkehr ohne Verhütung gehabt haben.
- Wenn Sie vergessen haben, Ihre Antibabypille einzunehmen.
- Wenn das Kondom Ihres Partners gerissen ist.
- Wenn Sie den Eindruck haben, Ihre Spirale verloren zu haben.
- Wenn Ihr Vaginalkondom oder Pessar sich verschoben haben oder zu früh entfernt wurden.
- Wenn Sie fürchten, dass die Methode des „unterbrochenen Verkehrs“ oder die Temperaturmethode nicht funktioniert haben.
- Nach einer Vergewaltigung.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NORLEVO 1,5 mg Tabletten BEACHTEN?

##### Norlevo 1,5 mg darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Levonorgestrel oder einen der übrigen Bestandteile der Tablette Norlevo 1,5 mg sind.
- Wenn Sie an seltenen Erbkrankheiten wie Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption leiden

**NORLEVO**  
1,5 mg  
TABLETTEN

##### • Der arzneilich wirksame Bestandteil ist:

Levonorgestrel ..... 1,5 mg pro Tablette

##### • Weitere Bestandteile (Hilfsstoffe) sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Povidon, hoch disperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat.

##### INHABER DER VERMARKTZULASSUNG, HERSTELLER UND IMPORTEUR

###### Zulassungsinhaber

Laboratoire HRA-Pharma  
15 rue Béranger  
75003 Paris - Frankreich

###### Hersteller

DELPHARM Lille  
Z.I. Roubaix Est - Rue de Toufflers  
59390 Lys-Lez-Lannoy - FRANKREICH

###### Importeur

Besins Manufacturing Belgium  
Groot-Bijgaardenstraat, 128  
1620 Drogenbos - Belgien

Cardinal Health France 429 S.A.S.  
17, rue de Pontoise  
95520 Osny - FRANKREICH

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Norlevo 1,5 mg Tabletten ist erforderlich:**

Notfallverhütung darf nur in Ausnahmefällen angewendet werden.

Begründung:

- Sie verhindert eine Schwangerschaft nicht in allen Fällen.
- Die Überdosierung an Hormonen, die sie verursacht, ist in regelmäßiger Einnahme nicht wünschenswert.
- Sie kann eine normale Verhütung nicht ersetzen.

**Norlevo ist keine Methode zum Schwangerschaftsabbruch.**

Wenn Sie im selben Zyklus vor mehr als 72 Stunden ein erstes Mal ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten, ist eine Befruchtung im Zusammenhang mit diesem ersten ungeschützten Geschlechtsverkehr möglich. Die Behandlung mit Norlevo nach einem zweiten Geschlechtsverkehr kann also zur Vermeidung einer Schwangerschaft wirkungslos bleiben.

Norlevo 1,5 mg wird nicht empfohlen:

- wenn Sie schon eine extrauterine Schwangerschaft hatten (eine Schwangerschaft, die sich außerhalb der Gebärmutter entwickelt, am häufigsten in einem Eileiter) oder wenn Sie eine Salpingitis (Eileiterentzündung) hatten, da in diesem Fall ein erhöhtes Risiko der Entstehung einer extrauterinen Schwangerschaft besteht.
- wenn Sie an der Laktose intolerant sind.

- wenn Sie an einer schweren Leberkrankheit oder einer schweren Verdauungsinsuffizienz, zum Beispiel an der Crohn-Krankheit leiden, da die Wirksamkeit von Norlevo verringert werden kann.

Bei Erbrechen innerhalb von drei Stunden nach Einnahme der Tablette muss sofort eine weitere Tablette eingenommen werden.

Aufgrund der Möglichkeit schwerer Zyklustörungen wird davon abgeraten, Norlevo 1,5 mg mehrmals innerhalb eines Menstruationsszyklus einzunehmen. Eine langfristige Verhütungsmethode ist dann eher angezeigt.

Nach der Einnahme von Norlevo 1,5 mg ist die Monatsblutung im Allgemeinen normal und tritt zum vorgesehenen Datum ein.

Dennoch ist es notwendig, einen Schwangerschaftstest zu machen, um sicher zu stellen, dass Sie nicht schwanger sind,

- wenn die Monatsblutung mit einer Verspätung von mehr als fünf Tagen eintritt;
- wenn die Blutung ungewöhnlich erscheint, auch wenn sie zum vorgesehenen Datum eintritt.

Die Anwendung der Notfallverhütung erübrigt nicht die Vorsichtsmaßnahmen gegen sexuell übertragbare Krankheiten und Maßnahmen gegen Ansteckungsrisiken.

Wenn Sie bereits andere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Einnahme von Norlevo 1,5 mg mit anderen Arzneimitteln“. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn einer dieser Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

**BEI EINNAHME VON NORLEVO ZUSAMMEN MIT NAHRUNGSMITTELN UND GETRÄNKEN**

Nicht zutreffend.

**SCHWANGERSCHAFT**

Dieses Arzneimittel ist während einer bestehenden Schwangerschaft nicht angezeigt.

Wenn im Fall des Versagens dieser Notfallverhütung doch eine Schwangerschaft eintritt, besteht kein besonderes Risiko auf Missbildungen des Fötus.

Bei Einnahme einer Dosis von mehr als 1,5 mg Levonorgestrel sind die Folgen für das Kind unbekannt.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**STILLZEIT**

Sie können ein Baby stillen. Da Levonorgestrel aber in die Muttermilch ausgeschieden wird, wird empfohlen, unmittelbar vor der Einnahme der Tablette Norlevo 1,5 mg Tabletten zu stillen und danach mindestens 6 Stunden lang nach der Einnahme von Norlevo 1,5 mg nicht zu stillen.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DAS BEDIENEN VON MASCHINEN**

Über die Auswirkungen dieses Arzneimittels auf die individuellen Fähigkeiten, ein Fahrzeug zu lenken oder eine Maschine zu bedienen, liegen keine Erfahrungswerte vor.

**WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER BESTIMMTE SONSTIGE BESTANDTEILE VON NORLEVO**

Jede Tablette Norlevo 1,5 mg enthält Laktose. Wenn Sie an einer Intoleranz gegenüber gewissen Zuckern leiden, informieren Sie erst Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

**BEI EINNAHME VON NORLEVO MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN**

Die gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln wie bestimmten Antikonvulsiva (Phenobarbital, Phenytoin, Primidon, Carbamazepin), bestimmten Antibiotika wie Rifabutin, Rifampicin, Griseofulvin, Ritonavir; *Hypericum perforatum* (Johanniskraut, ein pflanzliches Präparat, das bei Depressionen eingesetzt wird) kann die Wirksamkeit dieser Notfallverhütung senken oder aufheben.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzen eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**3. WIE IST NORLEVO 1,5 mg Tabletten EINZUNEHMEN?**

Halten Sie diese Anweisungen genau ein, außer Ihr Arzt hat Ihnen andere Anweisungen gegeben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die Behandlung erfolgt mit **einer Tablette**. Die Tablette ist mit einem Glas Wasser einzunehmen.

Die Tablette muss so früh wie möglich eingenommen werden, vorzugsweise innerhalb von 12 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, spätestens jedoch innerhalb von 72 Stunden (3 Tagen) nach dem Verkehr.

**Die Notfallverhütung ist umso wirksamer, je schneller sie angewendet wird. Ihre Wirksamkeit sinkt zwischen 24 und 72 Stunden um etwa die Hälfte.**

Dieses Arzneimittel kann zu jedem Zeitpunkt im Menstruationszyklus eingenommen werden.

Die Einnahme von Norlevo 1,5 mg steht der Einnahme Ihrer üblichen Antibabypille nicht im Wege.

Wenn Sie Norlevo 1,5 mg eingenommen haben, weil Sie die Pille vergessen hatten, müssen Sie die Packung der Pille bis zum Ende einnehmen. Wenn Sie danach keine Monatsblutung bekommen, müssen Sie sich anhand eines Schwangerschaftstests vergewissern, dass Sie nicht schwanger sind.

4

Nach der Einnahme dieser Notfallverhütung und bis zu Ihrer nächsten Monatsblutung wird nachdrücklich empfohlen, beim Geschlechtsverkehr ein **lokales Verhütungsmittel** (Kondom, Vaginalkondom, Spermien törendes Mittel) zu verwenden.

**WENN SIE EINE GRÖSSERE MENGE VON NORLEVO EINGENOMMEN HABEN, ALS SIE SOLLTEN**

Bei der Einnahme mehrerer Dosen wurde keine akute Toxizität dieses Arzneimittels nachgewiesen.

Übelkeit und menstruationsähnliche Blutungen können auftreten.

Es gibt kein spezifisches Antidot; die Behandlung muss symptomatisch sein. Wenn Sie zu viel NORLEVO verwendet oder eingenommen haben, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt, Ihrem Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

**WENN SIE DIE EINNAHME VON NORLEVO VERGESSEN HABEN**

Die Wirksamkeit dieses Arzneimittels ist nicht gesichert, wenn die Tablette nicht nach der Empfehlung eingenommen wird. In diesem Fall müssen Sie sich vergewissern, dass Sie nicht schwanger sind, wenn Ihre Monatsblutung nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt eintritt.

**WENN SIE DIE EINNAHME VON NORLEVO ABGEBROCHEN HABEN**

Nicht zutreffend.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Norlevo 1,5 mg Tabletten Nebenwirkungen haben:

- Übelkeit und Erbrechen,
- Schwindelgefühl, Müdigkeit, Kopfschmerzen,
- Schmerzen im Unterbauch,
- Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut,
- Spannungsgefühl in der Brust,
- verzögertes Eintreten der Monatsblutung,
- besonders starke Monatsblutung,
- Durchfall.

Menstruationsähnliche Blutungen können nach der Einnahme von Norlevo 1,5 mg eintreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

**5. WIE IST NORLEVO 1,5 mg Tabletten AUFZUBEWAHREN?**

Nehmen Sie NORLEVO nach dem Verfalldatum nicht mehr ein.

Das Verfalldatum wird nach der Abkürzung Ex. angegeben. Die vier Ziffern nach dieser Abkürzung bezeichnen den Monat (letzter Tag) und das Jahr, ab dem das Produkt als verfallen zu betrachten ist.

Blisterpackung lichtgeschützt im Umkarton aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wenn Sie an einer Tablette Beschädigungen feststellen, übergeben Sie sie bitte Ihrem Apotheker, er wird sie entsorgen.

**6. WEITEREANGABEN**

Wenn Sie Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem lokalen Vertreter des Inhabers der Vermarktungszulassung in Verbindung:

Besins Manufacturing Belgium

Groot-Bijgaardenstraat, 128

B-1620 DROGENBOS - BELGIEN

Tel.: + 32 (0) 29 43 38

E-Mail: ppette@besins-healthcare.com

Nicht verschreibungspflichtig.

Datum der letzten Neuüberarbeitung dieser Gebrauchsinformation:

21 April 2008.

Datum der Genehmigung der Gebrauchsinformation:

Juli 2008.

**RATSSCHLÄGE / GESUNDHEIT****a) Einige Anmerkungen:****- zum Menstruationszyklus**

Der Menstruationszyklus ist die Zeit zwischen zwei Monatsblutungen. Der Zyklus dauert in den meisten Fällen 28 Tage, er beginnt am ersten Tag der Monatsblutung und endet am ersten Tag der folgenden Monatsblutung. Aber die Dauer eines Zyklus kann von Frau zu Frau unterschiedlich sein.

Die Monatsblutung tritt ein, wenn eine Frau nicht schwanger ist.

**- zur Befruchtung**

In der Mitte des Zyklus wird durch einen der 2 Eierstöcke eine Eizelle ausgestoßen (das ist der „Eisprung“). Im Allgemeinen findet der Eisprung in der Mitte des Zyklus statt, er kann aber zu jedem Zeitpunkt des Zyklus eintreten.

Wenn sich Samenzellen in der Nähe der Eizelle befinden, kann die „Befruchtung“ stattfinden (das ist das Zusammentreffen der Eizelle und einer Samenzelle, woraus ein Embryo entsteht).

Nach einigen Tagen setzt sich das befruchtete Ei in der Gebärmutter fest (es nistet sich ein) und die Schwangerschaft beginnt.

**- zur Empfängnisverhütung**

Die Methoden zur Empfängnisverhütung verhindern Folgendes:

- den Eisprung: das ist der Fall bei der Antibabypille,
- die Befruchtung (Zusammentreffen der Samenzellen und der Eizelle): das ist der Fall des Kondoms,
- die Einnistung der befruchteten Eizelle: das ist der Fall der Spirale.

**- zur Notfallverhütung**

Die Notfallverhütung will den Eisprung blockieren oder die Befruchtung während eines Zyklus verhindern. Sie ist allerdings wirkungslos, wenn die Einnistung bereits begonnen hat.

Bei fehlender Verhütung kann eine Frau die Möglichkeit niemals ausschließen, nach dem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden.

Wenn Sie dieses Arzneimittel verwendet haben und Sie normalerweise keine Verhütungsmittel verwenden, empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, sich an Ihren Arzt zu wenden, um eine für Sie passende Verhütungsmethode zu besprechen.

**b) Risiken nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr und Ratschläge**

Wenn Sie eine Schwangerschaft fürchten, kann das bedeuten, dass Sie beim Geschlechtsverkehr kein Kondom verwendet haben (oder dieses nicht ordnungsgemäß benutzt haben). Sie können also eine sexuell übertragbare Krankheit oder das AIDS-Virus bekommen haben, wenn Sie den Gesundheitszustand Ihres Partners nicht kennen oder mehrere Partner haben. Sie müssen sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt wenden, der Sie untersuchen und Ihnen eine rasche Behandlung bieten kann.

Bei Ihren folgenden sexuellen Kontakten sollten Sie für Ihre Situation geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine unerwünschte Schwangerschaft oder eine sexuell übertragbare Krankheit sowie eine Ansteckung durch das AIDS-Virus zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an ein Zentrum für Familienplanung.

5001011